

Листок-вкладыш – информация для пациента

Анксилера®, 50 мг, капсулы
Действующее вещество: этифоксин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Анксилера®, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Анксилера®
3. Прием препарата Анксилера®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Анксилера®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Анксилера® и для чего его применяют

Препарат Анксилера® содержит действующее вещество этифоксин, относящееся к фармакотерапевтической группе под названием «психолептики; анксиолитические средства; другие анксиолитические средства». Обладает анксиолитическим (противотревожным) действием, в меньшей степени оказывает седативное действие. Не вызывает привыкания и синдрома отмены.

Показания к применению

Препарат Анксилера® показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения тревоги и связанных с ней психосоматических расстройств.

Способ действия препарата Анксилера®

Анксиолитическая активность этифоксина обусловлена влиянием на передачу импульса рецептором ГАМК-А. Непрямое действие этифоксина на ГАМК-А рецептор обеспечивается посредством увеличения синтеза нейростероидов (особые молекулы, которые синтезируются в мозге и играют важную роль в работе нервной системы).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Анксилера®**Противопоказания**

Не принимайте препарат Анксилера®:

- если у Вас аллергия на этифоксин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас шоковые состояния (угнетение центральной нервной системы (ЦНС) любой этиологии);
- если у Вас тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;